

TABLA DE CONTENIDOS

Olimpiada Nacional de Ciencias (ONC) Matemática, Tercero Básico

Contenidos declarativos, procedimentales y algunos comentarios explicativos.
Año 2026, contenidos de todas las fases de la olimpiada.



Olimpiada Nacional
de Ciencias

APTITUDES

- ▶ ingenio
- ▶ meticulosidad
- ▶ concentración
- ▶ precisión
- ▶ imaginación

ÁREAS

Conjuntos y Lógica

Razonamiento

Aritmética

Geometría

Álgebra

Combinatoria

Estadística y probabilidades

CONJUNTOS Y LÓGICA

Fundamentos

Manejo teórico y operativo de conceptos como el de conjunto vacío, conjunto universo, cardinalidad, y las relaciones de pertenencia (\in) y contención (\subseteq). Conjuntos numéricos: conjunto de los números naturales (\mathbb{N}), enteros (\mathbb{Z}), racionales (\mathbb{Q}) y los números reales (\mathbb{R}).

Importante

Operaciones con conjuntos

Representación gráfica, enumerativa y descriptiva de la unión o intersección de dos o más conjuntos. Representación gráfica, enumerativa y descriptiva de la diferencia o diferencia simétrica de dos conjuntos, y del complemento de un conjunto dentro de un universo dado (notación: A^C , es el complemento del conjunto A). Pares ordenados, ternas ordenadas, construcción gráfica y enumerativa del producto cartesiano de dos conjuntos dados, construcción enumerativa del producto cartesiano de tres conjuntos. Cardinalidad de un conjunto. Cardinalidad de productos cartesianos de dos o tres conjuntos. Principio de inclusión y exclusión para dos, tres o cuatro conjuntos. Operaciones con conjuntos infinitos. Leyes de DeMorgan en conjuntos.

Ejemplo de operación con conjuntos infinitos: En \mathbb{Z} , ¿Cuál es la intersección del conjunto de los múltiplos de tres con los pares?

Subconjuntos

Capacidad de enumerar todos los subconjuntos de un conjunto dado que posea una cantidad reducida de elementos (por ejemplo: el conjunto de las vocales). Subconjuntos de k elementos dentro de un conjunto de n elementos (con $k \leq n$). Contención propia (\subset) e impropia (\subseteq). Escritura de subconjuntos infinitos de los enteros o naturales en forma descriptiva.

A manera de ejemplo, los múltiplos de tres pueden codificarse en forma descriptiva así: $\{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Proposiciones

Concepto de proposición y valor de verdad. Concepto de proposición abierta.

Una proposición abierta es aquella que tiene variables indeterminadas y no cuantificadas, propiamente hablando no es una proposición pues no tiene valor de verdad, a menos que se determine el valor de sus variables. Por ejemplo: “El número x es par” es una proposición abierta. Puede concebirse como un conjunto de proposiciones.

Conectivos lógicos y tablas de verdad

Construcción de tablas de verdad para los conectivos lógicos básicos (conjunción \wedge , disyunción \vee , negación \neg , condicional \rightarrow y bicondicional \leftrightarrow) para dos o más proposiciones simples. Proposición compuesta. Valor de verdad de una proposición compuesta. Valor de verdad de una proposición simple dados los valores de una o varias proposiciones compuestas en las que está incluida. Equivalencia lógica. Negación de proposiciones que involucran la palabra “existe” o la frase “para todo”.

Importante

Leyes de la lógica

Leyes operativas de los conectivos lógicos (asociatividad, conmutatividad, idempotencia, etc.). Leyes de De Morgan. Uso de las leyes para verificar la equivalencia lógica de proposiciones compuestas sin usar tablas de verdad.

RAZONAMIENTO

Argumentación y demostración

Capacidad de elaborar argumentos convincentes. Capacidad de elaborar demostraciones que no sean demasiado complicadas, de forma directa o por contradicción.

En particular, si al alumno se le solicita un argumento, se espera una explicación clara y convincente, aunque no debe cubrir absolutamente todos los detalles ni ser enteramente formal. Una demostración en matemáticas, por el contrario, debe ser clara, convincente, formal y sin agujeros lógicos.

Importante

Acertijos lógicos y problemas de razonamiento

Pueden ser de diversa índole: problemas que involucren la subdivisión en casos o el análisis meticuloso de los datos ofrecidos; problemas sobre personajes que mienten o dicen la verdad; la utilización de balanzas o contenedores de manera secuencial para realizar ingeniosamente cálculos o comparaciones; búsqueda de errores en razonamientos; problemas que versen sobre mensajes codificados u operaciones aritméticas inventadas específicamente para esta competencia; búsqueda de estrategias óptimas para ser aplicadas a juegos matemáticos o situaciones varias; etc.

Esta sección se combina con otros contenidos de cualquiera de las áreas a evaluar, por lo que es incluida de manera frecuente.

Importante

Patrones

Identificación y aplicación de patrones establecidos sobre figuras geométricas, tablas de datos, números u otros objetos para la determinación de un objeto final, después de un número finito de aplicaciones de la regla o patrón.

Algunos problemas que consisten en la detección de patrones no son problemas matemáticos válidos, pues pueden depender del punto de vista y tener infinitas respuestas posibles. Tales problemas no serán evaluados. Ejemplo de un problema inválido: "Hallar el siguiente número en la sucesión: 2, 4, 6, ...". El problema es inválido pues tiene infinitas posibles respuestas, el patrón podría continuar así: "2, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 42, 44, 46, ...", o así: "2, 4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 18, ..." Note cuán diferente parece el último patrón si se lee de tres en tres (el patrón parece completo), o si se pone atención únicamente a los números que se repiten y los que no se repiten, que ocurren de manera alternada (el patrón parece incompleto pues el 2 debería repetirse). Incluso podría no haber un patrón, tal y como se entiende la palabra.

ARITMÉTICA

Axiomas

Comprensión de las leyes o axiomas algebraicos de los números, con respecto a las operaciones de suma y multiplicación (conmutatividad, asociatividad, distributividad, existencia del elemento neutro y la unidad, y existencia de elementos simétricos e inversos). Capacidad de verificar y justificar si las leyes se cumplen o no para una nueva operación cuya definición es indicada en un problema.

Divisibilidad

Definición de la relación de divisibilidad. Diferencia entre la relación de divisibilidad ($4 \mid 12$ es verdadero) y la operación de división ($12 \div 4 = 3$). Algoritmo de la división (dividendo = divisor \times cociente + residuo). Propiedades de la divisibilidad en \mathbb{N} (reflexividad, antisimetría y transitividad). Definiciones de divisor, múltiplo, divisor común, múltiplo común, máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (MCM) para dos o más números. Argumentos vía paridad (por ejemplo: se puede utilizar en un argumento el hecho de que la suma de varios números puede ser impar solamente si entre los sumandos hay una cantidad impar de impares). Criterios de divisibilidad para números que sean potencias de dos (2,4,8,16,...), potencias de diez, potencias de cinco, y los criterios de 3, 7, 9 y 11. Algoritmo de Euclides para la determinación del MCD de dos números. La función aritmética τ : número de divisores positivos de un número natural.

Por ejemplo, $\tau(10) = 4$, porque 10 tiene 4 divisores positivos distintos. El símbolo τ se lee tau.

En algunos textos tradicionales, el algoritmo de Euclides para el MCD es conocido como el "método de las divisiones sucesivas".

Primos

Definiciones de número primo y número compuesto. Definición de primos relativos. Criterio para verificar si un número dado es primo (verificar si es múltiplo de algún número mayor que 1 y menor o igual a su raíz cuadrada). Construcción de la criba de Eratóstenes. Definición de primos gemelos. Definición de números perfectos.

Importante

Operatoria

Importante

Suma, resta, multiplicación y división de números enteros, racionales y reales. Manejo de las operaciones mencionadas tanto en decimales como con fracciones. Fracciones equivalentes y simplificación de las mismas. Conversión de números racionales entre las formas siguientes: número mixto, fracción (propia o impropia), número decimal y porcentaje. Potenciación y radicación de enteros y racionales. Leyes de los exponentes y de las raíces. Leyes de los signos para la multiplicación o división de números. Jerarquía de las operaciones incluyendo signos de agrupación. Definición de factorial y su jerarquía en las operaciones.

Teorema Fundamental de la Aritmética

Importante

Conocimiento y comprensión del enunciado del teorema. Factorización en primos de un número natural dado. Determinación del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números vía sus factores primos. Capacidad de determinar si un número es divisor de otro vía la comparación de sus factorizaciones primas. Fórmula de la función τ en términos de la factorización prima del número.

Orden

Relaciones de orden ($<$, $>$, \leq y \geq). Capacidad de ordenar de menor a mayor o de mayor a menor un conjunto dado de números enteros o racionales, posiblemente expresados mediante combinaciones de operaciones aritméticas. La desigualdad cuadrática como herramienta para elaborar argumentos.

La desigualdad cuadrática dice que todo número real elevado al cuadrado da un resultado no negativo. Se puede usar para elaborar argumentos como el siguiente: el máximo valor que puede tomar la expresión $25 - x^2 - y^2$ es 25, sin importar el valor que tomen las variables.

Sucesiones y series

Definiciones de: sucesión aritmética, sucesión geométrica, serie aritmética y serie geométrica. Fórmula de Gauss para la suma de enteros consecutivos. Determinación de términos específicos en sucesiones definidas recursivamente o sucesiones que poseen una forma cerrada. Fórmula para series geométricas finitas.

Le llamamos forma cerrada a una manera de saber el resultado sin tener que calcular cierta operación que posee un patrón. Por ejemplo, si se suman los enteros positivos impares desde 1 hasta cierto número impar, el resultado siempre es un cuadrado perfecto. Note que la suma de los primeros cuatro impares $1 + 3 + 5 + 7$ da como resultado el cuadrado de 4, que es 16.

Ecuaciones de recurrencia

Concepto de recurrencia, definición de términos iniciales y de solución. Verificación de que una fórmula cerrada dada sea solución de una ecuación de recurrencia. Conocimiento de las ecuaciones de recurrencia para series aritméticas, series geométricas y factoriales.

No se evaluará métodos específicos para la resolución de ecuaciones de recurrencia, como el método del polinomio característico; sin embargo, se puede esperar que el alumno conjeture la solución de una ecuación simple, empleando su ingenio, y verifique que cumple las condiciones para ser solución.

Ecuaciones diofantinas

Ecuaciones sencillas en dos o más variables con soluciones enteras. Por ejemplo, encontrar los pares de enteros (x, y) tales que sean solución de la ecuación $x^2 + y^2 = 25$. Ecuaciones diofantinas que se resuelven vía la aplicación del teorema fundamental de la Aritmética, por ejemplo, $(x - 1)(y + 2) = 77$. La ecuación diofantina lineal.

Lema de Euclides

Conocimiento del enunciado y aplicación del lema de Euclides, que dice: si p es un primo que divide al producto ab , entonces p debe dividir a alguno de los factores: a o b (o tal vez a ambos).

A manera de ejemplo, considere el ejercicio siguiente: demuestre que los únicos números n tales que $n^2 - n$ sea divisible por 7 son los múltiplos de 7 y aquellos que dejan residuo 1 al dividirlos por 7.

Demostración: por el lema de Euclides, el hecho que 7 divida a $n(n-1)$ implica que 7 debe dividir a n , o bien a $n-1$. Estos casos corresponden a los múltiplos y los que dejan residuo 1, respectivamente. En las fases finales de la competencia, el uso del lema de Euclides podría ser en contextos más complicados que este ejemplo.

GEOMETRÍA

Razonamiento espacial

Capacidad de imaginar figuras sólidas construidas a partir de otras más simples. Estrategias para contar aristas, caras y vértices de figuras sólidas construidas a partir de cubos, tetraedros regulares, prismas y otras figuras simples. Rotación, traslación y reflexión de figuras sólidas o planas, posiblemente iterando o combinando dichas transformaciones.

Conceptos básicos

Definición de segmento de recta y su notación, definición de circunferencia, arcos de circunferencia, rectas tangentes a circunferencias, rectas secantes a circunferencias, cuerdas, diámetro y radio de circunferencias. Proporcionalidad como factor de conversión, y conversiones entre medidas lineales, cuadráticas y cúbicas (por ejemplo, de metros cúbicos a centímetros cúbicos)

Polígonos

Clasificación y nomenclatura de las figuras según el número de lados y otras propiedades (triángulos, cuadriláteros, paralelogramos, rombos, cuadrados, rectángulos, romboides, trapecios, trapecios isósceles, trapezoides, pentágonos, hexágonos, etc.). Clasificación de triángulos según sus ángulos (obtusángulo, rectángulo, acutángulo) y según sus lados (equilátero, isósceles, escaleno). Perímetro y área de figuras geométricas (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, paralelogramo, etc.). Definición de vértices, lados y diagonales de polígonos.

Los romboides también son llamados deltoides. Entre los matemáticos de Guatemala es común la nomenclatura de Julio Rey Pastor, en la que los romboides NO son un caso particular de los paralelogramos, sino que corresponden a la figura geométrica que intuitivamente se identifica con los barriletes (deltoides). En muchos libros europeos y norteamericanos, se le llama romboide al paralelogramo que no es rombo. En la terminología de Rey Pastor, a esta figura se le llama simplemente "paralelogramo general". La ventaja de decir deltoide es que el término no es ambiguo, no importando la escuela geométrica que se siga.

Figuras sólidas

Volumen y área superficial de algunas figuras geométricas sólidas (cubo, esfera, cilindro, y prisma recto o pirámide con cualquier figura de base). Definición de vértices, aristas y caras de figuras sólidas en las que tales conceptos apliquen. Definición de poliedro y conocimiento de los sólidos platónicos. Conocimiento de la característica de Euler.

La característica de Euler es una propiedad combinatoria poseída por una gran familia de poliedros. En las pruebas nunca será evaluado de manera directa, pero su conocimiento puede facilitar la solución de algunos problemas muy particulares.

Ángulos y temas afines

Comprensión y manejo de las medidas angulares en grados y radianes. Conversión entre medidas. Ángulos coterminales. Teorema de la suma de los ángulos internos en un triángulo (180 grados), sumas de los ángulos internos en cuadriláteros (regulares o irregulares). Ángulos entre paralelas (correspondientes, opuestos por el vértice, alternos internos y alternos externos). Sectores circulares (perímetro y área). Definición de polígono inscrito y polígono circunscrito a una circunferencia. Cálculo de ángulos internos de polígonos regulares y de polígonos estrellados. Cuadriláteros cíclicos y la propiedad que indica el valor de la suma de ángulos opuestos en uno de esos cuadriláteros.

Importante

Semejanza y congruencia

Concepto y reconocimiento de triángulos semejantes y congruentes. Reconocimiento de figuras geométricas (triángulos y otras) rotadas, trasladadas o dilatadas. Criterios de congruencia de triángulos: lado-lado-lado, lado-ángulo-lado y ángulo-lado-ángulo. Criterios de semejanza de triángulos: lado-lado-lado, lado-ángulo-lado y ángulo-ángulo.

Importante

Teoremas fundamentales

Teorema de los ángulos en la base de un triángulo isósceles (Pons asinorum). Teorema de Pitágoras. El teorema del ángulo central y el del ángulo inscrito. Teorema de Tales sobre el triángulo inscrito en una semi-circunferencia. Los teoremas de Tales sobre rectas paralelas. Teorema de las diagonales de un paralelogramo y teorema de las diagonales de un deltoide. Conocimiento de los enunciados y la capacidad de aplicarlos en la resolución de problemas.

Geometría analítica

Concepto del plano cartesiano y las coordenadas de un punto. Ecuación de la recta: forma punto-pendiente, forma estándar y forma general. Interceptos en x y en y . Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales y dos variables por el método gráfico. Ecuación de una circunferencia centrada en el origen, y centrada en otro punto.

Trigonometría

Definición de seno, coseno y tangente, en términos de los lados de un triángulo rectángulo. Valores del seno, coseno y tangente para ángulos notables: 0° , 30° , 45° , 60° y 90° . Resolución de problemas que involucran calcular o expresar un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo, en términos de otros lados y ángulos. Identidad pitagórica trigonométrica: $\text{sen}^2 \theta + \text{cos}^2 \theta = 1$.

ÁLGEBRA

Axiomas

Propiedades de las operaciones suma y producto en el contexto algebraico (asociatividad, conmutatividad, cerradura, distributividad, elemento neutro, elemento simétrico e inversos).

Conceptos básicos

Definición de polinomio, término, monomio, binomio, trinomio, etc. Diferenciación entre los conceptos de variable y constante. Diferenciación entre los conceptos de dato (constante conocida) e incógnita (constante desconocida). Definición del grado de un polinomio, clasificación de polinomios según el grado (lineal, cuadrático, cúbico, cuártico, quintico).

Operatoria algebraica

Valuación de expresiones algebraicas para valores específicos de las variables. Operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) aplicadas a polinomios y a expresiones racionales. Radicales aplicados a monomios. Expansión de productos y simplificación de expresiones algebraicas, reducción de términos semejantes en polinomios y simplificación de expresiones racionales ya expresadas en términos de factores repetidos. Algoritmo de la división para polinomios (división larga con cociente y residuo).

Las expresiones racionales son fracciones tales que su numerador y su denominador son polinomios.

Productos notables

Binomio al cuadrado, producto de binomios conjugados, binomio al cubo, producto de binomios con un término común, cuadrado de un polinomio. Expansión de un binomio a cualquier potencia natural mediante el triángulo de Pascal.

Casos de factorización

Casos de factorización en una o más variables: factor común, factores comunes por agrupación, trinomio cuadrado perfecto, tetranomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, factorización por agrupación, factorización de trinomios cuadráticos más generales (por cualquier método), factorización de Sophie Germain, factorización por la fórmula cuadrática, factorización por división larga, opcional: factorización por división sintética. Definición de polinomio cuadrático irreducible.

Sophie Germain es el nombre más común para el caso de factorización de expresiones del tipo $x^4 + 4y^4$. De manera general, se incluyen aquí factorizaciones vía suma y resta de términos cuidadosamente elegidos.

Divisibilidad de polinomios

Definición de divisibilidad **para polinomios**. Propiedades de la divisibilidad (notar que la antisimetría no aplica en polinomios, pero sí aplican la transitividad y reflexividad). Definiciones de múltiplo, divisor, múltiplo común, divisor común, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Algoritmo de Euclides para la determinación del MCD de dos polinomios.

Este algoritmo de Euclides es la generalización algebraica del método de divisiones sucesivas que aparece en el apartado de Aritmética.

Importante

Teorema fundamental del álgebra

Definición de raíz de un polinomio. El teorema del factor. El teorema del residuo. Conocimiento del enunciado del teorema fundamental del Álgebra para polinomios con coeficientes reales. Concepto de polinomio cuadrático irreducible y de número complejo, en el contexto de las raíces de los polinomios cuadráticos irreducibles.

El teorema fundamental del Álgebra dice que todo polinomio con coeficientes reales se puede factorizar hasta el punto que todos los factores sean polinomios lineales o cuadráticos irreducibles, con coeficientes reales.

Los números complejos no serán evaluados de manera directa en las pruebas, pero el conocimiento de tales números puede facilitar el trabajo en ciertos problemas muy particulares. Es, por tanto, un contenido opcional que puede ofrecer alguna ventaja.

Ecuaciones, desigualdades e inecuaciones

Diferenciar entre una ecuación y una identidad algebraica. Resolución de ecuaciones lineales mediante despeje algebraico. Resolución de ecuaciones cuadráticas por completación de cuadrados, casos de factorización y fórmula cuadrática. Discriminante de un polinomio cuadrático y su relación con la naturaleza de las raíces. Resolución de ecuaciones cúbicas o cuárticas, solamente si puede lograrse vía los casos de factorización. Concepto de inecuación (\neq) y desigualdad ($<$, $>$, \leq y \geq). Resolución de una inecuación o desigualdad lineal en una variable. Resolución de una inecuación o desigualdad cuadrática en una variable. Resolución de ecuaciones y desigualdades con un valor absoluto. Despejes que involucren operaciones algebraicas inversas, fórmula cuadrática, y valores absolutos. Representación gráfica (recta numérica) y por intervalos de la solución. Sistemas de ecuaciones lineales en pocas variables (entre 2 y 6, típicamente).

En los exámenes se aplica el convenio de notación siguiente: un intervalo abierto se representa con paréntesis, en tanto que un intervalo cerrado con corchetes. Así por ejemplo, el intervalo abierto de 3 a 5 es $(3,5)$, mientras que el intervalo cerrado sería $[3,5]$.

Desigualdades en varias variables

Llevar a cabo argumentos que dependan de una o varias aplicaciones de la desigualdad cuadrática en su versión algebraica. Por ejemplo, se puede demostrar que $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$ multiplicando ambos miembros por 2, pasando a restar los términos de la derecha y así construyendo tres cuadrados perfectos: $(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 \geq 0$, y ésta última es cierta por la suma de tres desigualdades cuadráticas.

La desigualdad cuadrática en el contexto algebraico dice que toda expresión algebraica elevada al cuadrado es mayor o igual a cero. Por ejemplo $(x - \frac{1}{x})^2 \geq 0$, para cualquier $x \neq 0$.

COMBINATORIA

Principios

Conocer el enunciado y saber aplicar el principio de la suma, el principio de la multiplicación, el principio de inclusión y exclusión para pocos conjuntos (típicamente menos de 6), y el principio de las casillas o principio de Dirichlet.

El principio de inclusión y exclusión nos dice que la cardinalidad de la unión de varios conjuntos es igual a la suma de las cardinalidades individuales, restándole las de las intersecciones a pares, sumándole las de las intersecciones a tríos, y así sucesivamente.

Importante

Importante

El principio de las casillas dice: si se desea clasificar objetos en casillas, con la posibilidad de colocar uno, ninguno, o varios objetos en cada casilla, y si se cuenta con más objetos que casillas, entonces forzosamente habrá una casilla con más de un objeto.

Conteo

Importante

Conocer la definición de factorial y su conexión con el conteo, la definición de permutación (con repetición y sin repetición), y la definición de combinación (con repetición y sin repetición). Cálculo del número de permutaciones o combinaciones para conjuntos pequeños por exhaustión (sin fórmulas). Cálculo mediante fórmulas del número de permutaciones con repetición ${}_n\overline{P}_k$, permutaciones sin repetición ${}_nP_k$, combinaciones sin repetición ${}_nC_k$, también denotado $\binom{n}{k}$, y combinaciones con repetición ${}_n\overline{C}_k$, también denotado $\left(\binom{n}{k}\right)$. Problemas de conteo que involucran la división por casos.

Ejemplo de la división en casos: ¿Cuántos números de tres dígitos son tales que su primer y último dígito son iguales? En este problema se observa que forzando al dígito repetido a valer 1, se obtienen números del tipo $1 \square 1$, de los cuales hay 10 diferentes, y lo mismo sucede con las otras ocho posibilidades para el dígito repetido, esto es, $9 \times 10 = 90$ números en total.

Grafos

Conceptos de grafo, vértice y arista. Interpretación de poliedros como grafos. Problemas de conteo en grafos. Definición de árbol en el contexto de grafos y definición de grafo conexo.

Ejemplo: Calcular cuántas estrechadas de mano ocurren entre diez personas, si se sabe que cada persona estrechó la mano una vez con cada una de las otras nueve.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Medidas de tendencia central

Cálculo de moda, media y mediana de un listado de números reales. Elaboración de tablas de frecuencia para un conjunto de datos. Rango de un conjunto de datos. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Problemas algebraicos que involucran promedios, modas y medianas.

Por ejemplo: Si Juan y Pedro tienen en promedio 20 quetzales, y se sabe que Pedro tiene 24, ¿Cuántos quetzales tiene Juan?

Probabilidad

Concepto básico de probabilidad para un número finito de eventos posibles (tiros de dados, selección de cartas en una baraja, tiros de monedas, etc.). Probabilidad conjunta de eventos independientes. Concepto de eventos mutuamente excluyentes y, entre ellos, los eventos complementarios. Entender la relación entre los principios de conteo: el principio de la suma, el de la multiplicación, y el de inclusión y exclusión con la probabilidad.

OBSERVACIONES

Las barras que en el inicio del documento indican la frecuencia con la que se evalúa un área particular se miden en proporción al área más evaluada, que en este caso es Aritmética. Estas mediciones representan una aproximación basada en las pruebas de años anteriores. Debe tenerse en cuenta que cada año se fabrican pruebas originales, por lo que la medición no es perfecta.

Si un problema emplea el teorema de Pitágoras, por ejemplo, típicamente tendrá que evaluar también la valuación de fórmulas algebraicas. Por esta razón, algunas preguntas evalúan múltiples temas. Todos los temas son útiles, pero se han marcado con una etiqueta que dice “Importante” aquellos que resultan evaluados con una frecuencia mayor, dentro de cada área. Aún así, la distribución de temas es bastante balanceada (siguiendo la proporción de las barras).

En olimpiadas nacionales de otros países es poco frecuente encontrar contenidos explícitos para la competencia. Esto se debe a que su propósito principal es detectar potencial e ingenio, y no tanto el conocimiento de los estudiantes. Si, durante la prueba, un estudiante se encuentra con un problema que pareciera no encajar con los contenidos anteriormente desglosados, o un formato de problema que típicamente se usa para evaluar contenidos más avanzados, **necesariamente existirá un método de solución más ingenioso que solamente emplea los contenidos listados.**

FUENTES DE CONSULTA Y PRÁCTICA

Además de los ejemplos de pruebas de años anteriores que han sido subidos a la página oficial, se sugiere consultar **olimpiadas nacionales** de años anteriores para países latinoamericanos, especialmente países centroamericanos (las pruebas nacionales de El Salvador, por ejemplo, que se pueden consultar en esta página: <https://www.jovenestalento.edu.sv/matematica/archivo/>). Asimismo, las **olimpiadas canguro**, que existen en varios países, son buena práctica. La dificultad de los problemas puede variar bastante en los distintos países según el formato: las preguntas pueden ser de opción múltiple, respuesta directa o procedimiento completo; el tiempo disponible para la prueba puede variar.

Aunque los contenidos no se evalúan con frecuencia a nivel teórico, es importante tener cierto dominio de los conceptos básicos listados en este documento. Cualquier libro de matemática usado en colegios e institutos de Guatemala puede servir como una plataforma básica, y sobre ésta construir conocimientos adicionales consultando fuentes más especializadas. Ver por ejemplo los libros de la serie “**Cuadernos de Olimpiada**” de México, en la página <https://www.ommenlinea.org/>, en la pestaña prepárate. Incluso las páginas de Wikipedia u otras enciclopedias en línea pueden contribuir en la solidificación de los conocimientos.